

## Caracterização do perfil de utilização de medicamentos num grupo de idosos coberto por uma unidade de saúde da família do DS Cabula-Beirú, no Município de Salvador-BA, Brasil.

Mariana Bezerra Tavares, Michele Rios Gonçalves, Patrícia Sodr  Ara jo, Carlos Magno Ramos de Carvalho J nior, Gilmar Antonio Teles de Carvalho J nior

Universidade do Estado da Bahia

**Introdu o:** Trabalhos relacionados a tem tica dos idosos tem demonstrado a relev ncia do tema (SILVA et al., 2009). Pr ticas de risco no uso de medicamentos entre idosos, somada a n o ades o ao tratamento farmacol gico,  s rea o es adversas e etc, contribuem para a morbidade e mortalidade relacionada ao uso de medicamentos nessa popula o (SANTOS et al., 2013). No entanto, estudos que apresentem o perfil de sa de entre idosos especificamente na Bahia n o foram encontrados. **Objetivo:** Com isso, o objetivo deste estudo   caracterizar o perfil de utiliza o de medicamentos num grupo de idosos coberto por uma unidade de sa de da fam lia do Distrito Sanit rio Cabula-Beir , no munic pio de Salvador-BA, Brasil. **M todo:** Estudo transversal, descritivo, com idosos cobertos por uma USF de Salvador, BA, realizado entre novembro de 2015 a abril de 2016. A popula o do estudo considerou os 643 idosos cobertos pela USF. Os dados foram coletados em formul rios semiestruturados com quest es destinadas  s pr ticas terap uticas dessa popula o. Os dados totalizados foram sumarizados para an lise descritiva no software Excel  e receberam an lise estat stica. Os princ pios ativos presentes nos medicamentos usados foram agrupados de acordo com o Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC). A pesquisa foi aprovada pelo CEP-UNEB. **Resultados:** Entrevistaram-se 288 indiv duos (44,7%). Cerca de 90% dos medicamentos utilizados foram prescritos e o acesso a estes referido pelos entrevistados indicou que 45,14% buscam seus medicamentos em drogarias, 37,85% conseguem pelo SUS e 7,29% adquirem pela Farm cia Popular. As doen as mais prevalentes na popula o idosa foram HAS (67,71%); dislipidemia (42,01%); artrite/artrose ou reumatismo (38,19%) e diabetes (30,21%). Em geral, 51% dos idosos t m autopercep o de sa de regular. Cerca de 41% automedicam-se. Os medicamentos do sistema cardiovascular foram os mais utilizados (54%). A Losartana (9,7%) foi o medicamento mais utilizado, dado compat vel com protocolos e diretrizes que recomendam-na como medicamento de primeira escolha para o tratamento de HAS. A Sinvastatina (7,8%) e Metformina (7,1%) tiveram alto consumo, o que pode relacionar-se com o encontrado quanto  s doen as mais prevalentes na popula o. **Conclus o:** No estudo observou-se que o perfil de utiliza o de medicamentos no grupo da pesquisa foi semelhante a outros estudos de utiliza o de medicamentos no Brasil. No geral, a popula o foi mais acometida por HAS, DM e Dislipidemia, o que relaciona-se com o alto consumo por medicamentos dos sistemas cardiovascular, digestivo/metabolismo e nervoso. Logo h  um desafio para as pol ticas p blicas propor medidas que visem a promo o da sa de e o uso racional de medicamentos nessa popula o.